

## Toelichting van het meetinstrument

### Falls Efficacy Scale International (FES-I)

#### Parkinson specifiek

28 maart 2019

Review en invoer: E van Engelen

#### 1 Algemene gegevens

	Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën
<b>Lichaamsregio</b>	Onderste extremiteit
<b>Aandoening (ICD)</b>	Parkinson
<b>Domein 'Menselijk functioneren' (ICF)</b>	Mobiliteit/bewegen

- *Korte beschrijving* → In de 'Falls Efficacy Scale International' (FES-I) wordt de valangst van de patiënt bij het uitvoeren van ADL-activiteiten en sociale activiteiten gemeten. De patiënt wordt gevraagd om zijn bezorgdheid om te vallen tijdens een bepaalde activiteit aan te geven op een 4-puntsschaal. In totaal zijn 16 activiteiten opgenomen en een hoge score komt overeen met een grote valangst. Bij de FES-I opgenomen in de KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson wordt tevens aangegeven dat de partner, familielid of mantelzorger mag ondersteunen bij het invullen van het formulier.
- *Doelgroep* → patiënten met de ziekte van Parkinson
- *Auteur*:
  - ✓ *Oorspronkelijke versie* → FES: Tinetti ME, Richman D, Powell L (1994)<sup>3</sup>  
FES-I: Yardley L, et al. (2005)<sup>1</sup>
  - ✓ *Nederlandse versie* → beschikbare versie afkomstig uit KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson (2016)

**Generieke informatie over het meetinstrument treft u aan  
in het originele toelichtingsformulier.**