

# Glasgow Coma Schaal

**Dit document bevat 3 verschillende versies van de Glasgow Coma Schaal:**

- 1) Glasgow Coma Schaal voor Volwassenen Pag. 2
- 2) Glasgow Coma Schaal voor kinderen van 2 tot 5 jaar Pag. 3
- 3) Glasgow Coma Schaal voor kinderen jonger dan 2 jaar Pag. 4

## Glasgow Coma Schaal voor Volwassenen

Onderwerp	Omschrijving	Punten	Score
E= Openen van de Ogen	De ogen worden spontaan geopend	4	
	De ogen worden pas geopend op aanspreken van de patiënt	3	
	De ogen worden pas geopend bij een pijnprikkel	2	
	De ogen blijven gesloten	1	
V= Beste verbale reactie	Helder en duidelijk bewust van de situatie	5	
	Verwarde conversatie maar wel in staat om te antwoorden op de vragen	4	
	Woorden zijn te verstaan maar vormen geen zinnen	3	
	De spraak is niet te verstaan	2	
	Geen enkel verbale response	1	
M= Beste motorische reactie	Een eenvoudig bevel wordt uitgevoerd	6	
	In staat zijn de pijn duidelijk te localiseren	5	
	In staat om een afwerende of wegtrekkende beweging te maken op een pijnprikkel	4	
	Armen en handen op krampachtige manier geplooid. Meestal benen gestrekt.	3	
	Armen en handen op krampachtige manier geplooid met naar buitengedraaide hand. Mogelijk alle spieren van het lichaam gespannen	2	
	Geen enkele lichamelijke reactie op een pijnprikkel	1	
EMV-score:		Totaalscore:	

## Glasgow Coma Schaal voor kinderen van 2 tot 5 jaar

Onderwerp	Omschrijving	Punten	Score
E= Openen van de Ogen	De ogen worden spontaan geopend	4	
	De ogen worden pas geopend op aanspreken van de patient	3	
	De ogen worden pas geopend bij een pijnprikkel	2	
	De ogen blijven gesloten	1	
V= Uitdrukking	Woorden of kleine zinnen in context van de situatie	5	
	Verwarde woorden	4	
	Aanhoudend huilen of krijsen	3	
	Alleen kreunen	2	
	Geen enkel verbale response	1	
M= Beste motorische reactie	Een eenvoudig bevel wordt uitgevoerd	6	
	In staat zijn de pijn duidelijk te localiseren	5	
	In staat om een afwerende of wegtrekkende beweging te maken op een pijnprikkel	4	
	Armen en handen op krampachtige manier geplooid. Meestal benen gestrekt.	3	
	Armen en handen op krampachtige manier geplooid met naar buitengedraaide hand. Mogelijk alle spieren van het lichaam gespannen	2	
	Geen enkele lichamelijke reactie op een pijnprikkel	1	
EMV-score:		Totaalscore:	

## Glasgow Coma Schaal voor kinderen jonger dan 2 jaar

Onderwerp	Omschrijving	Punten	Score
E= Openen van de Ogen	De ogen worden spontaan geopend	4	
	De ogen worden pas geopend op aanspreken van de patiënt	3	
	De ogen worden pas geopend bij een pijnprikkel	2	
	De ogen blijven gesloten	1	
V= Uitdrukking	Lacht of huilt zachtjes	5	
	Huilt en is onpasselijk	4	
	Aanhoudend huilen of krijsen	3	
	Kreunen en onrustig/rusteloos	2	
	Geen enkel verbale response	1	
M= Beste motorische reactie	Een eenvoudig bevel wordt uitgevoerd	6	
	In staat zijn de pijn duidelijk te localiseren	5	
	In staat om een afwerende of wegtrekkende beweging te maken op een pijnprikkel	4	
	Armen en handen op krampachtige manier geplooid. Meestal benen gestrekt.	3	
	Armen en handen op krampachtige manier geplooid met naar buitengedraaide hand. Mogelijk alle spieren van het lichaam gespannen	2	
	Geen enkele lichamelijke reactie op een pijnprikkel	1	
EMV-score:		Totaalscore:	

### Referentie:

- Van den Brink; Leerboek Intensive Care-verpleegkunde, Elsevier Gezondheidszorg 2000
- Glasgow Coma Schaal [cited 07-06-2012] . Available from:  
[http://www.zorginformatiemodel.nl/1\\_documentatie/Doc\\_Obs\\_Glasgow\\_Coma\\_Scale\\_R01\\_V1.1.pdf](http://www.zorginformatiemodel.nl/1_documentatie/Doc_Obs_Glasgow_Coma_Scale_R01_V1.1.pdf)