

## Shoulder Function Assessment (SFA)

Patiënt: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

A.	Pijn bij bewegen					
	_____		_____ maximale pijn			
	Pijn bij rust					
	_____		_____ maximale pijn			
_____ punten (max. 20 punten)						
B.	Activiteiten van het dagelijks leven					
		zonder probleem (5 pnt)	weinig moeite (3 pnt)	veel moeite (2 pnt)	met hulp (1pnt)	onmogelijk (0 pnt)
	aankleden					
	haar kammen					
	andere oksel wassen					
	toilet gebruik					
	_____ punten (max. 20 punten)					
C.	<b>Range of motion</b>					
	Totale abductie, actief: 1 punt per 10° beweging (maximaal 18 punten)					_____ punten
	<b>Gecombineerde beweging</b> (max. 12 pnt.)	mogelijk (6 pnt.)	gedeeltelijk mogelijk (3 pnt.)	onmogelijk (0 pnt.)		
	Hand op het hoofd, elleboog achterwaarts					
	Hand op het hoofd, elleboog voorwaarts					
_____ punten (max. 30 punten)						
<b>Totaal A t/m C</b> _____ punten (max. 70 punten)						

\* helemaal geen pijn = 10 punten; max. pijn = 0 punten

De totaalscore varieert tussen 0 punten (zeer beperkte schouderfunctie) en 70 punten (volledige schouderfunctie)